

BERG, est d'une taille plus forte et offre des teintes plus claires, c'est-à-dire tirant au gris, à-peu-près comme dans la véritable hirsuta du Continent Indien. Aile 8 pouces 5 lignes; queue 4 pouces 11 lignes.

Ce voyageur nous a enfin adressé de l'île de Sanghir, située au nord de Célèbes, une Chouette semblable, par ses teintes très-foncées, à notre *Noctua hirsuta borneënsis*, mais de taille un peu plus forte. Aile 7 pouces 7 lignes; queue 4 pouces 4 lignes.

NOCTUA PHILIPPENSIS.

Les îles Philippines nourrissent une Chouette, que j'avais introduite (*Mus. d. Pays-Bas, Striges*, p. 26) comme conspecies de la *Noctua hirsuta*, sous le nom de *Noctua hirsuta philippensis*. Ceci est une méprise. Cet oiseau forme une espèce distincte de la *hirsuta* par ses tarses en grande partie parsemés de soies, par sa taille beaucoup moins forte, enfin par ses teintes et plus particulièrement par ses ailes parsemées de taches blanches. Ce sera par la suite notre *Noctua philippensis*.

NOCTUA OCHRACEA.

Nous devons à M. VON ROSENBERG un individu d'une Chouette, recueilli à Célèbes, et en général semblable à la *philippensis*, mais offrant une queue plus longue et un système de coloration diversement modifié. Ce sera notre *Noctua ochracea*.

Teinte du fond des parties supérieures d'un brun foncé pourpré et tirant un peu au grisâtre sur la tête. Face et menton blanchâtres. Une longue raie surciliaire produite par des taches blanches des plumes de cette partie. Plumes de la région des oreilles à baguettes blanches. Ailes parsemées de taches blanches, assez larges sur les plumes scapulaires. Pennes de la queue ornées d'environ sept bandelettes claires. Plumes souscaudales blanches. Plumes du dessous du cou brunes avec de larges bords roux; celles du jabot brunes avec des taches en bandes transversales d'un jaune d'ocre foncé; celles de la poitrine et du ventre offrant cette dernière teinte, mais pourvues de quelques petites taches brunes, isolées et le plus souvent en coeur. Petites et moyennes couvertures inférieures des ailes jaune d'ocre avec des taches longitudinales et brunes. Grandes couvertures inférieures des ailes brunes avec des bandelettes blanches. Barbe interne des rémiges du second ordre et de la moitié basale des grandes rémiges également ornée de bandelettes blanches.

Aile 6 pouces 2 lignes; queue 3 pouces 8 lignes.

Iris d'un brun passablement foncé. Bec d'un blanc brunâtre (VON ROSENBERG).

L'individu décrit est une femelle tuée le 22 Septembre 1863 près de Negrilama à Célèbes.

PLATYCERCUS DORSALIS.

M. WALLACE, *Proceed. Zool. Soc. London*, 1862, p. 337, a décrit comme appartenant à une variété de cette espèce les individus provenant de l'Archipel Soula. Le caractère propre à cette variété résiderait, selon cet auteur, dans les teintes du bec, qu'il dit être rougeâtre et à pointe couleur de corne dans les individus de Soula, noir et avec une tache rouge à la base de la mandibule supérieure dans les individus de la Nouvelle-Guinée et des îles Papou.

Nos observations sur les individus de ces différentes contrées ne s'accordent pas avec celles de M. WALLACE. Nous possédons trois individus tués à Soula Mangoli, et tous ont le bec noir avec une large tache rouge à la base de la mandibule supérieure, en un mot teint comme dans ceux de Waaigeou et de la Nouvelle Guinée, tandis que dans une de nos femelles de Waaigeou (voir *Muséum des Pays-Bas, Psittaci, Catol.*, N^o. 6), le bec est partout teint de rouge uniforme. Ceci prouve que cette différence de teinte indiquée par M. WALLACE, comme étant constante suivant les localités, qu'habite l'espèce, n'est qu'accidentelle. Notez encore que le rouge du bec n'est guère prononcé chez les individus au jeune âge.

Nous ferons observer, en passant, qu'il n'en est pas ainsi de la différence des teintes du bec dans les individus du *Platycercus amboinensis*, provenant de Céram et de Bourou, ces premiers ayant le bec teint comme dans le *dorsalis*, tandis qu'il est d'un noir uniforme dans ces derniers.

ECLECTUS MEGALORHYNCHUS.

M. VON ROSENBERG nous a fait parvenir dix individus de cette espèce, tués dans l'île de Sanghir. Ils ressemblent, par leur taille un peu moins forte que d'ordinaire, aux individus ordinaires de Morotai (voir notre *Muséum des Pays-Bas, Psittaci*, p. 47). Aile, dans cinq individus, environ de 8 pouces 6 lignes; dans quatre autres environ de 9 pouces; dans le dixième de 9 pouces 4 lignes.

Il paraît que les individus de Guebéh et Waaigeou n'atteignent pas