

île de Wetter, située au nord de Timor, Hoedt. — 14. Adulte, Larantouka dans l'île de Flores, prés. en 1863 par M. Semmelink. — 15. Jeune, pris du nid, Flores, 1863, Semmelink. — 16. Femelle, tuée le 8 Juillet 1865, Ambodavi, Côte N. Ouest de Madagascar, voyage de Pollen et van Dam. — 17, 18, 19. Mâles, tués dans la baie de Passandava, Côte N. Ouest de Madagascar, 1869, voyage de van Dam. — 20. Femelle, baie de Passandava, 1869, van Dam. — 21. Jeune mâle, baie de Bombetok, Côte N. Ouest de Madagascar, 1870, van Dam. — 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mâles, tués en 1871, Mouroundava, Côte Ouest de Madagascar. — 28. Femelle, Mouroundava, 1871, van Dam.

SCOPS SIAOËNSIS.

Semblable au Scops manadensis, mais de très petite taille.

1. Adulte, tué à Siao-oudang, situé entre Célèbes et le groupe de Sanghir, prés. en 1866 par Jonkheer R. van Duyvenbode. Longueur totale 7 pouces. Aile 4 pouces 9 lignes. Queue 2 pouces 1 ligne.

SCOPS NOVAE ZEELANDIAE: voir Oti, 1862, p. 27.

Se distingue de toutes les autres espèces par le manque de taches claires aux plumes scapulaires. Teintes du dessus très foncées. Dessus de la tête noir brunâtre. Nuque ornée d'une écharpe de plumes roussâtres, mais vermiculées de noir, et suivie d'une écharpe noire.

Un seul individu.

B. Formes plus ou moins grêles. Tête, disque facial et oeil plus petits que d'ordinaire. Aigrettes médiocres. Doigts faibles. Tarses emplumés jusqu'aux doigts.

SCOPS ZORCA: voir Oti, 1862, p. 19.

Se distingue de tous les autres Scops par ses ailes plus pointues, la deuxième rémige étant ordinairement d'égale longueur